

Plan for samordnet lusebekjempelse Subregion Finnmark

Felles del for alle soner i subregion.

Sist revidert: 29.09.2022

Planen er gjeldende inntil det foreligger en ny revidert utgave. Planen revideres årlig.

Bakgrunn

Planen er utarbeidet med bakgrunn i krav i «Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg» (heretter kalt luseforskriften). Planen omfatter følgende selskaper:

SalMar Farming AS

Lerøy Aurora AS

Cermaq Norway AS

NRS Farming AS reg Finnmark

Grieg Seafood Finnmark AS

Kontaktinformasjon til disse selskapene er oppført i vedleggene for hver undersone.

Selskapene som er omfattet av denne planen inngår i videreføringen av næringens nasjonale luseprosjekt, Finnmark. Oppdrettsaktørene har inngått en forpliktende samarbeidsavtale for regional bekjempelse av lakselus i 2022 som videreføres i 2023 (se vedlegg). Viktige tiltak i samarbeidsavtalen er utveksling av relevant informasjon, herunder lusetall, følsomhetsundersøkelser og informasjon om tiltak mot lus, samt utarbeide en plan for samordnet lusebekjempelse i subregionene. Status medikamenter går årlig gjennom. Det deles ut info om og samarbeides om fiskehelse og sykdommer, og gruppen har utarbeidet en egen varslingsliste.

Det skal i tillegg arbeides målrettet for på sikt å optimalisere koordinering av utsettene, noe som vil bidra til optimalisering av lusebekjempelsen. En slik koordinering tjener og smittehygieniske problemstillinger vedrørende andre infeksjose sykdommer ved opprettelse av mer hensiktsmessige smittehygieniske fellesområder (ABM) innenfor det geografiske området som dekker opp lokalitetene tilhørende Finnmark. Det tas inn i arbeidet resultateter fra overvåkning på vill laks og vurderes om en må justere grensenivåer basert på overvåkingen. Jf også den felles lusebekjempelsen som gjøres i sensitiv vårutvandring for smolt.

Denne planen inneholder også strategi for bruk av forebyggende, kontrollerende og reduserende tiltak. Åkerblå AS ved Stine Myren har rollen som koordinator for samarbeidet. Mange av tiltakene i planen krever involvering av fiskehelsepersonell. Aktørene er forpliktet til å involvere sin fiskehelsetjeneste i samarbeidet. Det er lagt opp til at det gjennomføres 1 årlig samarbeidsmøte på våren, i tillegg til korte status-/ dialogmøter hver 14. dag i den travleste lusesesongen, og så etter behov. Hvert år skal det gjennomføres evaluering av samarbeidet med tanke på lusesituasjon og funksjonalitet. Luseplanen skal revideres årlig.

Følgende agenda for vårmøtet er etablert:

- *Vårmøtet*
 - *Evaluering av foregående lusesesong*
 - *Evaluering av samarbeidet*
 - *Revidering av overordnet luseplan*
 - *Statusgjennomgang/ midtveiseevaluering*


- Revidering av soneplaner (i tråd med driftsplaner)

Subregion Finnmark

Det geografiske området som utgjør Subregion Finnmark samsvarer med produksjonsområdene 12 og 13 (jfr. Produksjonsområdeforskriften). Området er avgrenset mot subregion Troms i vest og russergrensa i Øst.

Samarbeidsområdet er valgt ut fra geografi, og plassering og drift av akvakulturanlegg i nær tilhørighet med hverandre. I vest fungerer Loppa som grense mellom subregion Troms og subregion Finnmark. I øst er grensen til Russland.


Inndeling i hovedsoner og undersoner




Subregionen er inndelt i 2 hovedsoner, Øst og Vest-Finnmark. Hver hovedsone er delt opp i mindre undersoner som delvis også fungerer som brakkleggingssoner. Undersonene er valgt med bakgrunn i strømforhold, geografisk avstand mellom lokalitetene, driftsstruktur og naturlige barrierer basert på kunnskap som er tilgjengelig i denne avtaleperioden.

Det er utarbeidet egne vedlegg til denne planen for hver hovedsone. Vedleggene inneholder kart som viser aktuell hovedsone og undersoner, kontaktinformasjon, lokalitetsnummer, driftsplaner, og spesifikke tiltak som gjøres i hver sone for å begrense forekomsten av lakselus og utvikling av resistens, herunder samordnet utsett og brakklegging, samt bruk av forebyggende og kontrollerende tiltak mot lakselus (hhv. bruk av skjørt, rensefisk, o.l.).

Hovedsone 1 Vest-Finnmark



Hovedsone 2 Øst-Finnmark



Tabell 1. Oversikt over hoved- og undersoner i subregion Troms

Hovedsone	Undersone
Sone 1: Vest-Finnmark	Øksfjorden
	Ytre Loppa
	Snefjord
	Ryggefjord
	Sørøysundet
	Vargsundet
	Langfjorden
	Rognsundet
Sone 2: Øst-Finnmark	Nordkapp
	Gandvik
	Jarfjord
	Syltefjord
	Laksefjord

Utveksling av informasjon

Lusekoordinatoren samler inn resultater fra lusetellinger, både skottelus og lakselus, informasjon om planlagte og gjennomførte behandlinger, resultater av resistenstester, samt bruk av kontrollerende og forebyggende tiltak. Denne informasjonen samles i en statusoppdatering som sendes ukentlig på epost til alle selskaper og lokaliteter som er omfattet av denne planen, samt regional lusekoordinator

for Nord-Norge, koordinatorene for subregion Troms, aktører i tilgrensende subregioner (Troms) med lokaliteter i nærheten av subregion Finnmark.

I subregionmøte våren 2021 ble det vedtatt at det avholdes teamsmøter for aktørene i subregionen annenhver mandag eller etter behov. Hensikten med disse møtene er at aktørene skal dele informasjon omkring lusestatus og planlagte/ gjennomførte tiltak, og ut fra dette samhandle der det er formålstjenlig. Dette har så langt fungert etter hensikten og videreføres. Det utveksles også info rundt smittsom sykdom og tas opp aktuelle problemstillinger rundt helse og velferd som berører aktørene i området. Det er stor åpenhet rundt dette mellom aktørene i samarbeidet.

Rutiner for lusetelling og lusegrenser

Lusetellinger skal som et minimum gjøres i henhold til krav i gjeldende luseforskrift. Det oppfordres til at aktørene bruker sitt tilknyttede fiskehelsepersonell til å bidra med teoretisk og praktisk opplæring i lusetelling, samt kontrollere/kvalitetssikre at tellinger blir utført korrekt i forbindelse med rutinebesøk på anleggene.

Det anbefales at også skottelus telles og rapporteres da dette kan påvirke vurderingene som gjøres i forbindelse med bekjempelse av lus. Aktørene i subregion Finnmark rapporterer ukentlig inn skottelustall til koordinator.

Partene forholder seg som et minimum til de lusegrenser som er angitt i gjeldende luseforskrift.

Rutiner for samordnet lusebekjempelse gjennom året

Definisjoner

Tiltak mot lakselus kan deles opp i forebyggende-, kontrollerende og reduserende tiltak. Forebyggende tiltak er tiltak som hindrer kontakt mellom lus og fisk. Kontrollerende tiltak er tiltak som kontinuerlig fjerner lus fra fisken. Reduserende tiltak er tiltak som gjennomføres ved behov for rask og effektiv reduksjon av lusemengden på fisken.

Tabell 1: Inndeling av tiltak

Forebyggende tiltak	Kontrollerende tiltak	Reduserende tiltak
Sonedrift Skjerming/ skjørt	Rensefisk Laser	IMM Ferskvann Legemidler

Tidspunkt og tiltaksgrenser

Felles våravlusning

I mars 2017 ble §7, som omhandlet våravlusningen, fjernet og nye grenser for lakselus på våren lagt inn i § 8. Det som nå gjelder er at det i perioden f.o.m. uke 21 t.o.m. uke 26 til enhver tid skal være mindre enn 0,2 kjønnsmodne hunnlus i gjennomsnitt per fisk på lokaliteten. Resten av året er grensen

på 0,5 kjønnsmodne hunnlus. Det ble samtidig gjort endringer kravet til hvor mange fisk som skal telles og hvor mange merder som skal telles. Det skal telles lus i alle merder på lokaliteten hele året. I perioden f.o.m. uke 19 t.o.m. uke 26 skal det telles på 20 fisk i hver merd, resten av året er kravet minst 10.

Definisjon på brudd på 0,2 grensen

Definisjonene på brudd er definert av Mattilsynet.

Tre påfølgende uker mellom 0,2 og 0,3 kjønnsmodne hunnlus, og første telling over 0,3 kjønnsmoden hunnlus, regnes som brudd på 0,2-grensen.

Øvrige avlusinger

Det er et overordnet mål at avlusningene blir gjennomført før det blir stor produksjon av luselarver på lokaliteten, slik at egensmitte og smitte til nærliggende anlegg blir holdt på et lavt nivå. Avlusinger iverksettes etter behov, og hvis hensiktsmessig, koordinert med andre anlegg i samme område. Hvis en eller flere av lokalitetene da bruker et oralt avlusingsmiddel bør andre lokaliteter som badebehandler være ferdig avluset før effekten av det orale middelet går ut.

Fokus på å utnytte reduserende tiltak optimalt i desember, januar og februar. Dette for i størst mulig grad unngå å dra med seg lus inn i perioden hvor lav sjøtemperatur gjør det utfordrende å gjennomføre reduserende tiltak, og videre å ha minst mulig lus når potensialet for larveproduksjon igjen øker med temperaturen på våren. Hvor mye lus man drar med seg inn i våren kan ha stor betydning for hvor store utfordringer man får påfølgende høst.

Slakting er foretrukket framfor behandling når fisken har nådd normal slaktevekt.

Forebyggende og kontrollerende tiltak

I tillegg til forebyggende effekter av sonedrift anbefales bruk av skjerming. Rensfisk kan vurderes på lokaliteter hvor det anses som forsvarlig og hensiktsmessig å bruke som kontrollerende tiltak.

Reduserende tiltak

Avlusning med ikke-medikamentelle metoder

Subregion Finnmark gjorde sine første erfaringer med bruk av ikke medikamentelle metoder (IMM) i 2017 og de fleste avlusningene gjennomføres nå med IMM. Disse systemene innebærer håndtering av fisk og er derfor best egnet i perioder med temperert vann når risikoen for sårutvikling er liten. I tidsrommet fra temperaturen passerer 5 grader på våren (stigende temperatur) til temperaturen når 7 grader på høsten/ vinteren (synkende temperatur) bør man derfor prioritere avlusning med disse mekaniske systemene.

Avlusning med legemidler

Som i landet for øvrig har det i subregionen de siste årene vært nedsatt følsomhet for avlusningsmidlene pyretroider (Alpha Max), azametifos (Salmosan og Azasure) og emamektin (Slice). Følsomhetsstatusen for hydrogenperoksid er relativt god, men tendensen er avtagende og man har andre steder sett at følsomheten for dette stoffet kan avta relativt raskt ved hyppig bruk.

Ectosan er et nytt legemiddel og har god følsomhet.

Ved lave sjøtemperaturer og ved redusert helsestatus er legemidler ofte det eneste behandlingsalternativet. Det har stor verdi å ha legemidler tilgjengelig til bruk i slike situasjoner og det oppfordres derfor til bruk av metoder som ikke er resistensdrivende for ovenfor nevnte legemidler når det er mulig.

- For å bevare effekten av legemidlene lengst mulig bør bruken reduseres til et minimum.
- Legemidler skal primært brukes når det ikke er forsvarlig å bruke IMM.
- Hvert legemiddel/ stoffgruppe skal fortrinnsvis ikke brukes mer enn én gang per generasjon på lokaliteten.
- Ved bruk av legemidler til avlusning skal behandlingen gjennomføres med et legemiddel hvor forventet effekt er forsvarlig med tanke på lusesituasjonen som helhet.
- Slice brukes fortrinnsvis ikke mer enn én gang per generasjon. Med den aktuelle følsomhetsstatusen har Slice redusert effekt på preadulte og adulte lus, og Slice har best effekt som påslagshemmer og på fastsittende stadier. Man søker derfor å utnytte denne effekten maksimalt.
 - I tilfellet det sitter betydelige mengder lus igjen etter en Slice-kur bør det gjøres tiltak for å fjerne denne.
 - Det kan i noen tilfeller være skotteluspåslag som utløser bruk av Slice
- På grunn av sine egenskaper (kan brukes året rundt, har effekt på alle stadier, er skånsomt) anses pyretroidene (Alpha Max og Betamax) som spesielt verdifulle legemidler. For å bevare effekten av/ følsomheten for denne stoffgruppen lengst mulig er det et mål å redusere bruken til å kun omfatte strategisk viktige tilfeller. Dette er typisk avlusninger på senhøsten/ tidligvinteren av fisk som fortsatt skal stå lenge i sjøen.
- Dersom lusekoordinator vurderer en planlagt avlusning til ikke være i tråd med strategien for subregionen skal dette tas opp med fellesskapet.

Tabell over tilgjengelige avlusningsmidler.

Medikament	Temperatur	Lusestadier	Kommentar
Badebehandling			
Salmosan / Azasure	Brukes med forsiktighet over 10 °C og ikke over 15 °C.	Dårlig virkning på fastsittende stadier.	Bør fortrinnsvis brukes i perioder med lavt smittepress/ lite fastsittende. Forlenget holdetid anbefales
AlphaMax	Kan brukes ved både lave og høye temperaturer.	Virker på alle stadier.	Brukes fortrinnsvis i perioder hvor IMM ikke er å anbefale.
Hydrogenperoksid (H ₂ O ₂)	Brukes med forsiktighet over 13 °C.	Dårlig virkning på fastsittende stadier.	Brukes fortrinnsvis i perioder hvor IMM ikke er å anbefale. Unngå bruk i perioder med høy algeforekomst i sjø.
Ectosan vet	Kan brukes ved lave og høye temperaturer	Dårlig virkning på fastsittende stadier.	Kan kun benyttes i lukket behandling i Brønnbåt, der en har rensesystem for vannet ut.
Fôrbehandling			

Slice	Kan brukes både ved høye og lave temperaturer, men temperatur over 7 grader er å foretrekke for best effekt.		Anbefales kun brukt 1 x pr generasjon.
Ektobann og Releeze	Ordinær behandling krever temperatur over 9 grader. Kan brukes ned til 5 grader ved forlenging av kuren.	Virker ikke mot kjønnsmoden lus.	Som hovedregel skal kitinsyntesehemmere ikke benyttes. Unntakstilfeller tas opp i gruppen.

Rutiner for evaluering av avlusinger

Behandlingseffekten skal evalueres etter hver gjennomført behandling med legemiddel (jfr. Lakselusforskriften § 9).

Anbefalt tid mellom avlusning og evalueringstilling etter behandling.

Metode/ legemiddel	Temp over 10 °C	Temp under 10 °C.
IMM	Samme dag + én uke etter	
Slice	7-14 dager	21-28 dager vinterstid*
Alpha Max	5-7 dager **	7-14 dager **
Salmosan	2- 4 dager ***	4-7dager ***
Ektobann	7-14 dager ****	14 - 21 dager ****
Releeze	7 dager	7-14 dager
Hydrogenperoksid	0-3 dager	0-3 dager
Ectosan	Samme dag + 1 uke etter	Samme dag + 1 uke etter

*Kan ta opp til 6 uker ved lave temperaturer (erfaringer fra vinterkampanje).

** Kun preadulte og adulte stadier (bevegelige lus) bør være tellende.


Kun adulte stadier bør være tellende. Ved evaluering av badebehandling ved høye temperaturer bør man telle kort tid etter behandling før de overlevende fastsittende lus rekker å utvikle seg til bevegelige. *På temperaturer under 11°C kan maks effekt sees 2-3 uker etter behandling.

Ivaretakelse av ville bestander av laks og sjøørret

På bakgrunn av utarbeidede plan med hensyn på kontroll, telling og registrering av lakselus, samt prosedyrer og samarbeidsavtaler for avlusning av fisk, mener samarbeidsutvalget i Subregion Finnmark at hensynet til ville laksebestander og sjøørret er ivaretatt. Høyeste nivå av lakselus forekommer sent ut på høsten. Dette er i en periode hvor hovedinnsiget for gytelaks og sjøørret er over og hvor laksesmolten har vadret ut i havet. Ved overholdelse av 0,2-grensen på våren, mener samarbeidsutvalget at lusenivåene i regionen ikke skal representerer noen reell trussel for den ville lakse- og sjøørretbestanden i regionen. Samarbeidsgruppen holder seg samtidig oppdatert på resultatene fra overvåking på villfisk salmonider og må vurdere ekstra tiltak om overvåkningen tilsier det.

Signering og vedlegg

For oppdrettsaktørene i subregion Finnmark
Molde 29.9.22



Stine Mari Myren
Koordinator subregion Finnmark

Vedlegg:

- Vedlegg til luseplanen med kart og detaljer for sone 1 Øst-Finnmark
- Vedlegg til luseplanen med kart og detaljer for sone 2 Vest-Finnmark

HØVEDKONTOR:
Blått kompetansesenter
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda

+47 72 44 93 77
post@akerbla.no
www.akerbla.no

AVDELINGER: Tromsø
Svolvær
Vesterålen
Kristiansund
Trondheim
Ålesund
Molde
Volda